

ডিউটি	ক্রমিক (ক্যা)	ক্রমিক (পিপি)	ক্রমিক (সিআই)	ক্রমিক (সিআই)
ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক
ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক

Handwritten signature and notes in Bengali.

উপ- পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া
পত্র প্রাপ্তি নং... ৪৭৬
তারিখ... ১৫/৪/১৬
নথি... ১৫/৪/১৬
কৃষি সনাক্তিক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারক নং: ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.২০/১৪৩০ (৮০)

তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.

বিষয়ঃ বোরো ধানের ক্ষমিতে রাস্ট রোগ আক্রমণে সতর্কবার্তা।

বর্তমানে দেশের কিছু কিছু এলাকায় বোরো ধান ক্ষেতে রাস্ট রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাস্ট রোগ যদি শুরুরেই দমন করা না যায় তাহলে শতভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। রাস্ট রোগের জীবাণু প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত ছড়ায়। আর যেখানে অনুকূল পরিবেশ পায় সেখানেই জীবাণু গাছের উপর পড়ে রোগ সৃষ্টি করে। তাই রাস্ট রোগ দেখা দিলে সময়ক্ষেপণ না করে সঙ্গে সঙ্গে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিনের বেলায় গরম (২৫-২৮° সে.) ও রাতের বেলা ঠাণ্ডা (২০-২২° সে.), শিশির ভেজা দীর্ঘ সকাল, অধিক আর্দ্রতা (৮৫% সা. তার. অধিক), মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া, কচলা আবহাওয়া এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই অনুকূল। এ ধরনের অনুকূল পরিবেশ দেখা দিলে ক্ষেতে রাস্ট রোগ না থাকলেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যে সমস্ত ক্ষমিতে এখন পর্যন্ত রাস্ট রোগের আক্রমণ দেখা যায়নি অথচ পাশের ক্ষমিতে রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে বা গত বছর সেই ক্ষমিতে রোগের আক্রমণ ছিল বা এলাকায় রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজমান, সেখানকার ধানের ক্ষমিতে রোগ হোক বা না হোক শীঘ্রই বের হওয়ার আগ মুহূর্তে টেকোনোমল+টাইসাইক্লোপিরিডিং গুণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ০.৫ গ্রাম/লিটার বা এজোসিপ্রিন+জাইফেনোকোনোমল গুণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ১ মিলি/লিটার বা টাইসাইক্লোপিরিডিং গুণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ০.৭৫ গ্রাম/লিটার বা টাইসাইক্লোপিরিডিং+প্রোপিকোনোমল গুণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ২ মিলি/লিটার অথবা থ্রায়োপেন্টে মিথাইল গুণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।

যে সমস্ত ক্ষমিতে রোগের আক্রমণ দেখা দিয়েছে সে সমস্ত ক্ষমিতে করণীয়-

- ১। রাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষমিতে ১-২ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
- ২। পাতা রাস্টের জন্য বিঘা প্রতি অভিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিশেষে বোরো ধান কাটার আগ পর্যন্ত কৃষকদের ঘন ঘন ক্ষেত পরিদর্শন করা সহ উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে বোরো ধানের রাস্ট রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
.....অঞ্চল (সকল)।

Handwritten signature
(মোঃ ফরিদুল হাসান)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

- অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:
১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
 ২. উপপরিচালক,জেলা (সকল)। (উপজেলায় প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো।)
 ৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারক নং : # ০৪৭

তারিখ ০৫/৪/১৬ খ্রিঃ

পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ
১। উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর/খোকসা/কুমারখালী/মিরপুর/ভেড়ামারা/দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

Handwritten signature
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কুষ্টিয়া।