

এক নম্বরে একসারণ্যবাহী, ঢাকায় উপস্থিত ডিকার নাম ও ব্যবহারবিধি

ক্র.নং	ডিকার নাম	সর্বকম তাপমাত্রা ও সর্বোচ্চের সময়	প্রতি ডায়াল টিকার পরিমাণ (মাত্রা)	ব্যবহারবিধি	সেব্যমূল্য (প্রতি ডায়াল)	মন্তব্য
১।	ব্রুসেল	২° - ৮°সে. - ৬ মাস	১৬	গর/মহিষ - ৬ সিসি চামড়ার নীচে বায়ুর-৩ সিসি চামড়ার নীচে ছাপল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নীচে	১৬০/-	৪ মাস বয়সে, ৪-৬ মাস অন্তর
২।	ভডুকা	২° - ৮°সে. - ৬ মাস	১০০	গর/মহিষ/ঘোড়া - ১ সিসি চামড়ার নীচে ছাপল/ভেড়া-০.৫ সিসি চামড়ার নীচে	৫০/-	৬ মাস বয়সে, ১ বছর অন্তর
৩।	বাননা	২° - ৮°সে. - ৬ মাস	২০	গর/মহিষ - ৫ সিসি চামড়ার নীচে ছাপল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নীচে	৩০/-	৬ মাস - ৩ বছর বয়সী প্রাপ্তিতে, ৬ মাস অন্তর
৪।	গলাফুলা	২° - ৮°সে. - ৬ মাস	৫০	গর/মহিষ-২ সিসি চামড়ার নীচে ছাপল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নীচে	৩০/-	২ বছর বয়সে, ৬ মাস পরপর। প্রকৃতিক এলাকায় ৬ মাস বয়সী বায়ুরে অর্ধেক মাত্রায়
৫।	পিলিখার	-২০°সে. - ১ বছর -২০° - ৫°সে. - ৬ মাস ২° - ৮°সে. - ১ মাস	১০০	ছাপল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে	৫০/-	৪ মাস বয়সে, ১ বছর অন্তর। মালের টিকা না দেওয়া থাকলে বাচ্চায় ২ মাস বয়সে ১ম, ৬ মাসে বৃটার ডোজ
৬।	ছাপলের রস	-২০°সে. - ১ বছর ২° - ৮°সে. - ১ মাস	১০০	ছাপল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে	৫৫/-	৪ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সী ছাপল/ভেড়ায় ১ বার
৭।	বাজা মুরগির বাণীকৃত (মিসিখারজিডি)	-৫° - ০°সে. - ৬ মাস ২° - ৮°সে. - ৪ মাস ধার্মিকভাবে বরফসহ-১ দিন	১০০	চোখে - ১ কেঁচা	১৫/-	৪-৭ দিন বয়সে, ১৪ দিন পর বৃটার ডোজ
৮।	বড় মুরগির বাণীকৃত (খোরজিডি)	-৫° - ০°সে. - ৬ মাস ২° - ৮°সে. - ৪ মাস ধার্মিকভাবে বরফসহ-১ দিন	১০০	মাংসে - ১ সিসি	১৫/-	২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর
৯।	কটিল পল্ল	-২০°সে. - ১ বছর -৫° - ০°সে. - ৫ মাস	২০০	পালকের চামড়ায় মুঁচিয়ে	৪০/-	৩০ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী বাচ্চায় ১ বার
১০।	সিঙ্কিয়ন পল্ল	-২০°সে. - ১ বছর -৫° - ০°সে. - ৫ মাস	২০০	পালকের চামড়ায় মুঁচিয়ে	২০/-	৩-৭ দিন বয়সী মুরগি/কুকুরে ১ বার
১১।	ইস-মুরগির কলেরা	-২০°সে. - ১ বছর ২° - ৮°সে. - ৬ মাস	১০০	চামড়ার নীচে - ১ সিসি	৩০/-	২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১২।	সালমোনেলাসিস/কটিল টাইফয়েড	২° - ৮°সে. - ৬ মাস	২০০	চামড়ার নীচে - ০.৫ সিসি	৪০/-	৪৫ দিন বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১৩।	গামবোরো	-২০° - ০°সে. - ১ বছর	১০০০	চোখে - ১ কেঁচা	২০০/-	১০-২১ দিন বয়সে, ৭ দিন পর বৃটার
১৪।	চামপ্রোগ	-৫° - ০°সে. - ৬ মাস ধার্মিকভাবে বরফসহ-১ দিন	১০০	বৃকের মাংসে-১ সিসি	৩০/-	২১-৩০ দিন বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১৫।	মালের	-২০°সে. - ১ বছর ২° - ৫°সে. - ৬ মাস	১০০০	চামড়ার নীচে - ০.২ সিসি	৩৫০/-	১ দিন বয়সে
১৬।	জলাতক (LEP)	-২০°সে. - ১ বছর ২° - ৮°সে. - ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুর - ৩ সিসি মাংসে	২৫/-	৩ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সে, ১ বছর অন্তর
১৭।	জলাতক (HEP)	-২০°সে. - ১ বছর ২° - ৮°সে. - ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুরের বাচ্চা, বায়ুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, খাল - ১.৫ সিসি, গরু-৩ সিসি মাংসে	২৫/-	মালের টিকা না দেওয়া থাকলে ২ মাস বয়সী কুকুরের বাচ্চার, গরু ৪ মাস বয়সে LEP

২